

EVÈNEMENTS THROMBOEMBOLIQUES ARTÉRIELS

CONTEXTE

Classe thérapeutique : Anti-angiogéniques

Terrain favorisant : antécédents thromboemboliques, âge > 65 ans, diabétiques

Mécanisme d'action : les anti-angiogéniques qui ciblent le VEGF altèrent la barrière endothéliale endoluminale pouvant provoquer une réaction d'hémostase primaire et induire la cascade de coagulation.

DIAGNOSTIC

Signes cliniques :

En fonction de leur localisation : accidents vasculaires cérébraux, infarctus du myocarde, accidents ischémiques transitoires et autres phénomènes thromboemboliques artériels (membre, organe profond, ...).

Histoire naturelle :

Délai d'apparition : brutal.

Durée : pas de régression spontanée en absence de traitement spécifique

Récurrence: oui en absence de traitement spécifique

Sévérité : toxicité grade 3-4 chez 1 à 4% des patients selon la molécule

Effet dose-dépendant : non

Echelle de sévérité (référence : NCI-CTC AE v4) :

- **Grade 1 :** NA
- **Grade 2 :** NA
- **Grade 3 :** thrombus asymptomatique, par exemple thrombus cardiaque non embolique, nécessitant un traitement médical.
- **Grade 4 :** tout accident thromboembolique artériel symptomatique avec mise en jeu du pronostic vital, par exemple en cas d'accident vasculaire cérébral, d'ischémie d'organe profond ou de membre, nécessitant une prise en charge en urgence.

Complications : Défaillance multi-viscérale, décès. Défaillance de l'organe ischémique de type cytolysse aiguë ou nécrose. Pour un organe creux : transformation hémorragique. Pour les complications neurologiques aiguës : comitialité, trouble de la vigilance. Pour les complications cardiaques aiguës : défaillance hémodynamique, trouble du rythme.

PRISE EN CHARGE

Traitement symptomatique :

Quelle que soit la cause, il s'agit d'une urgence thérapeutique

Thrombolyse intra-artérielle à discuter selon les contre-indications.

Désobstruction artérielle par artériectomie ou thromboaspiration.

Anticoagulation par héparine standard.

Traitements symptomatiques du retentissement d'organe.

Ajustement de posologie du médicament:

La survenue d'un accident thromboembolique artériel impose l'arrêt définitif du traitement.

Mesures préventives : non établies. Détecter les patients à risque.

Grade 4
Ischémie aigue d'une extrémité



Grade 4
Ischémie digestive

