

ANDROCUR - ACÉTATE DE CYPROTÉRONNE

Effets indésirables

Les effets indésirables les plus sévères associés à la prise d'ANDROCUR sont une toxicité hépatique, des tumeurs hépatiques bénignes ou malignes pouvant conduire à des hémorragies intra-abdominales et des événements thrombo-emboliques.

Affection des organes de reproduction et du sein

- inhibition de la spermatogenèse habituellement réversible à l'arrêt du traitement (pouvant entraîner une stérilité temporaire).
- gynécomastie habituellement réversible à l'arrêt du traitement.
- Impuissance.
- baisse de la libido.

Affections endocriniennes

- variation de poids.
- comme décrit avec d'autres antiandrogènes, l'utilisation chez l'homme de ANDROCUR 100 mg peut induire une perte osseuse laquelle constitue un facteur de risque d'une éventuelle ostéoporose. De très rares cas ont été rapportés lors d'un traitement prolongé par ANDROCUR 100 mg à la posologie moyenne de 100 mg par jour. Cet effet n'a pas été observé lors d'un traitement de courte durée.

Affections psychiatriques

- états d'agitation, humeur dépressive.

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales

- dyspnée.

Affections vasculaires

- aggravation d'une insuffisance veineuse des membres inférieurs.
- événements thromboemboliques.

Affections du système nerveux

- migraines et céphalées.

Affections hépatobiliaires

- ictères, hépatites cytolytiques, hépatites fulminantes, insuffisance hépatique.
- des tumeurs hépatiques bénignes ont pu être observées, voire des tumeurs hépatiques malignes conduisant à des cas isolés d'hémorragie abdominale.

Troubles généraux et anomalies au site d'administration

- fatigabilité, asthénie.
- bouffées de chaleur et sudation.

Affections de la peau et du tissu sous-cutané

- éruption (rash).

Affections du système immunitaire

- réaction d'hypersensibilité.

Troubles du système sanguin et lymphatique

- anémie.

Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl. kystes et polypes)

- des cas de méningiomes ont été rapportés en cas d'utilisation prolongée (plusieurs années) d'ANDROCUR à des doses de 25 mg par jour et plus.