

## DEPO-PRODASONE - ACÉTATE DE MÉDROXYPROGESTÉRONNE

## Effets secondaires

Les effets indésirables rapportés sont présentés dans le tableau ci-dessous :

<b>Système</b>	<b>Effets indésirables</b>
<b>Affections du système immunitaire</b>	Réactions d'hypersensibilité liées à la présence de parahydroxybenzoate de propyle et de méthyle, éventuellement retardées et exceptionnellement, bronchospasme
<b>Affections endocriniennes</b>	Effets corticoïde-like (de type syndrome de Cushing)
<b>Troubles du métabolisme et de la nutrition</b>	Modification du poids, Aggravation du diabète, Œdèmes/rétention hydrique
<b>Affections psychiatriques</b>	Dépression, Nervosité, Confusion, Modification de la libido, Insomnies
<b>Affections du système nerveux</b>	Vertiges, Céphalées, Perte de concentration, Somnolence, Infarctus cérébral, Effets de type adrénergique (tremblements fins des mains, transpiration, crampes nocturnes au niveau des mollets)
<b>Affections oculaires</b>	Troubles de la vision, Cataracte diabétique, Thrombose, rétinienne
<b>Affections cardiaques</b>	Infarctus du myocarde, Insuffisance cardiaque congestive, Palpitations, Tachycardie
<b>Affections vasculaires</b>	Majoration des symptômes fonctionnels en rapport avec une insuffisance veineuse des membres inférieurs, Troubles thromboemboliques, Thrombophlébite
<b>Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales</b>	Embolie pulmonaire
<b>Affections gastro-intestinales</b>	Constipation, Diarrhée, Sécheresse buccale, Nausées, Vomissements
<b>Affections hépatobiliaires</b>	Atteinte hépatique dont cholestatique
<b>Affections de la peau et du tissu sous-cutané</b>	Acné, Alopécie, Hirsutisme, Prurit, Eruption, Urticaire, Chloasma
<b>Affections du rein et des voies urinaires</b>	Glycosurie
<b>Affections des organes de reproduction et du sein</b>	Trouble du cycle menstruel (irrégularité, augmentation ou diminution des saignements), Aménorrhée, Ménométrorragies, Perturbations des sécrétions cervicales (cervico-vaginales), Erosions cervicales, Anovulation prolongée, Galactorrhée, Mastodynie, Tension mammaire
<b>Troubles généraux et anomalies au site d'administration</b>	Fatigue, Réaction au site d'injection, Malaise, Fièvre
<b>Investigations</b>	Modification de l'appétit, Anomalie des tests hépatiques, Diminution de la tolérance au glucose, Augmentation de la pression artérielle, Diminution des marqueurs biologiques de l'activité endocrinienne suivants : stéroïdes plasmatiques et urinaires, gonadotrophines plasmatiques et urinaires, protéines de liaison aux hormones sexuelles, Diminution des taux sanguins en ACTH et en hydrocortisol

Au cours de la surveillance post-commercialisation, de rares cas d'ostéoporose incluant des fractures ostéoporotiques ont été rapportés.