

DETICENE - DACARBAZINE

Effets secondaires

Réaction immédiate

- nausées, vomissements: débutant 1 à 3 h après l'injection et pouvant durer jusqu'à 12 h chez près de 90% des patients; l'intensité de ces troubles diminue progressivement les jours suivants;
- syndrome pseudogrippal avec fatigue, myalgies, malaises et fièvre a été rapporté chez près de 2 % des patients;
- plus rarement: paresthésies faciales, bouffées de chaleur, réactions allergiques;
- en cas d'extravasation au cours de la perfusion intraveineuse: douleur locale et risque de lésions tissulaires;
- des réactions de photosensibilisation ont été rapportées dans les jours suivant l'injection. Le malade doit être prévenu des risques de récurrence et de l'intérêt des mesures de photoprotection dans les jours suivants les cures ultérieures.

Réaction retardée

- insuffisance médullaire: leucopénie, thrombopénie, anémie, pancytopenie;
- comme avec les autres alkylants, quelques cas de syndrome myélodysplasique et de leucémie aiguë ont été signalés chez des malades recevant un traitement par dacarbazine en association avec d'autres cytotoxiques, en particulier des nitroso-urées;
- hyperéosinophilie;
- plus rarement: toxicité rénale ou hépatique: le nadir peut survenir plus tardivement que pour les autres alkylants (environ 21 jours);
- une toxicité sur le système nerveux central avec crises comitiales et démence a été rapportée avec des doses élevées de dacarbazine;
- alopecie modérée;
- une maladie veino-occlusive ou un syndrome de Budd-Chiari ont été observés lorsque le médicament est utilisé à de très fortes doses (dans le cadre de conditionnement de greffe de moelle);
- aménorrhée;
- azoospermie.