

FLUOROURACILE

Effets indésirables

Infections et infestations

Infections, sepsis.

Affections du système immunitaire

Hypersensibilité.

Affections gastro-intestinale

Stomatite, oesophagite, mucite, diarrhée ([voir rubrique 4.4](#)), anorexie, nausées, vomissements ; exceptionnellement : hémorragies digestives.

Affections de la peau et du tissu sous-cutané

Coloration brunâtre du trajet veineux, hyperpigmentation, alopecie, dermatite, éruption de prédominance palmo-plantaire (syndrome mains-pieds), rash, urticaire, photosensibilisation, anomalies des ongles, trouble de la pigmentation, peau sèche.

Affections cardiaques

Quelques cas d'angines de poitrine, de modifications transitoires de l'ECG et exceptionnellement d'infarctus du myocarde ont été rapportés, le plus souvent lors de la première cure et plus précocement vers le 2^{ème} ou 3^{ème} jour, tachycardie, arythmie.

Affections vasculaires

Thrombophlébite, bouffées de chaleur.

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales

Epistaxis, dyspnée.

Affections hématologiques et du système lymphatique

Myelosuppression, neutropénie, pancytopenie, leucopénie, thrombocytopénie, et plus rarement anémie.

Affection du système nerveux

Ataxie cérébelleuse, céphalées, vertiges, leucoencéphalopathie, aphasie, neuropathie périphérique.

Affections oculaires

Hypersécrétion lacrymale, conjonctivite, dacryosténose, troubles visuels, diplopie, baisse d'acuité visuelle.

Troubles généraux et anomalies au site d'administration

Fatigue, asthénie.

Déclaration des effets indésirables suspectés

La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr